



Antiparassitario spot on completo e sicuro, a base di fipronil e permetrina

Antiparassitario con attività repellente e acaricida per **4 settimane su pulci, zecche, zanzare e flebotomi**. Il prodotto può essere utilizzato come parte di una strategia di trattamento per il controllo della Dermatite Allergica da Pulci (DAP).



CONFEZIONI

Codice AIC / EAN	Prodotto	Confezione
104680020	Effitix Toy (1,5-4 kg)	4 pipette da 0,44 ml
104680032	Effitix Toy (1,5-4 kg)	24 pipette da 0,44 ml
104680069	Effitix Small (4-10 kg)	4 pipette da 1,1 ml
104680071	Effitix Small (4-10 kg)	24 pipette da 1,1ml
104680107	Effitix Medium (10-20 kg)	4 pipette da 2,2 ml
104680119	Effitix Medium (10-20 kg)	24 pipette da 2,2 ml
104680145	Effitix Large (20-40 kg)	4 pipette da 2,2 ml
104680158	Effitix Large (20-40 kg)	24 pipette da 4,4ml
104680184	Effitix Extralarge (40-60 kg)	4 pipette da 6,6 ml
104680196	Effitix Extralarge (40-60 kg)	24 pipette da 6,6 ml

INDICAZIONI

Nei cani, da utilizzare contro le infestazioni da pulci e/o zecche, quando è anche necessaria un'attività repellente (anti-puntura) contro i flebotomi e/o zanzare.

■ Pulci:

Per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci (*Ctenocephalides* spp.). Un trattamento previene l'infestazione da nuovi parassiti adulti per **quattro settimane**. Le pulci sui cani vengono uccise entro 24 ore dal trattamento. Il prodotto può essere utilizzato come parte di una strategia di trattamento per il controllo della **Dermatite Allergica da Pulci (DAP)** quando questa sia stata precedentemente diagnosticata dal medico veterinario.

■ Zecche:

Trattamento delle infestazioni da zecche di *Ixodes ricinus*. Un trattamento determina, per **quattro settimane**, una persistente ecacia acaricida contro l'infestazione da zecche (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus* e *Rhipicephalus sanguineus*). Se zecche di specie (*Dermacentor reticulatus* e *Rhipicephalus sanguineus*) sono presenti quando viene applicato il prodotto, non tutte vengono uccise entro 48 ore dal trattamento.

■ Flebotomi e Zanzare:

Un trattamento determina una attività repellente (anti-puntura) contro flebotomi (*Phlebotomus perniciosus*) e zanzare (*Culex pipiens*, *Aedes aegypti*) per **quattro settimane**.

Per il foglietto illustrativo completo, consultare:

https://www.vetinfo.it/j6_prontuario/farmaci/prontuariofiles/public/openPdf/1779/

POSOLOGIA

Rimuovere la pipetta dal blister. Tenere la pipetta in posizione verticale. Scuotere la parte stretta della pipetta per assicurare che il contenuto sia all'interno della parte principale della pipetta. Rompere il sigillo in cima alla pipetta spot-on lungo la linea segnata. Separare il pelo dell'animale fino a quando sia visibile la pelle. Posizionare la punta della pipetta direttamente contro la cute scoperta e schiacciare delicatamente più volte per svuotare il contenuto in due - quattro punti diversi, a seconda del peso corporeo, sulla schiena dell'animale. Come indicazione per un cane di peso inferiore a 20 kg il prodotto deve essere applicato in due punti, mentre in cani di peso superiore ai 20 kg applicare il prodotto in 2-4 punti.

COMPONENTI

Fipronil + Permetrina

Scopri di più sul nostro sito: <https://vet-it.virbac.com/home/prodotti/cani/antiparassitari/effitix-spot-on-cani.html>

Virbac S.r.l.

via Ettore Bugatti 15 - 20142 Milano
Tel. 02.4092471 - Fax 02.40924777
virbac@virbac.it - it.virbac.com

Shaping the future
of animal health

